

COCHENILLES – LONGUE DUREE
Prêt à l'emploi

Présenté dans une nouvelle bouteille, l'insecticide systémique prêt à l'emploi est particulièrement bien adapté à la lutte contre les cochenilles nuisibles au bon développement des rosiers, des arbres et arbustes d'ornement, des cultures florales et plantes d'intérieur.

- + **Nouvelle matière active en jardin**
- + **Action systémique**
- + **Protection jusqu'à 4 semaines**
- + **Protection des jeunes pousses**
- + **Format économique et facile d'emploi**



Référence	Présentation	Unités par carton
COCH900	900ml	12

Composition	Thiaclopride 0,15 g/l
Nom homologué	CALYPSO AL
N°A.M.M	2080089
Formulation	AL – Formulation Prêt à l'emploi
Classement	**R 52/53** : nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique **Emploi autorisé dans les jardins**
Cultures autorisées	Rosiers, cultures florales, arbres et arbustes d'ornement et plantes d'intérieur
Indication	Insecticide



Bayer S.A.S. - Jardin, Espaces verts et Hygiène publique
16 rue Jean-Marie Leclair - CS90106 - F-69266 Lyon Cedex 09
Tél. : 04 72 85 43 21 - Fax : 04 72 85 48 33







Mode d’emploi

- CALYPSO AL s'utilise en pulvérisation uniforme sur le végétal
- Traiter dès l'apparition des insectes ou de leurs premiers dégâts.
- Pulvériser à une trentaine de centimètres de la plante en prenant soin de bien mouiller, mais sans excès, les parties vertes du végétal
- Utilisation sur rosiers (pucerons, cochenilles, aleurodes), cultures florales diverses (pucerons, cochenilles, aleurodes, cicadelles), arbres et arbustes d’ornement (pucerons, cochenilles, cicadelles), toutes espèces florales (chrysomèles et tenthrèdes) et plantes d’intérieur (pucerons, cochenilles, aleurodes, cicadelles).
- pour l’ensemble des cultures il est possible de réaliser un 2nd traitement, 14 jours après le 1er, sauf sur pucerons.

Précautions d’emploi

Porter des gants et un vêtement de protection est recommandé pendant toutes les phases de manipulation du produit.

- **Lors de l’application :**
  Dangereux pour les abeilles. Ne pas traiter en présence d’insectes pollinisateurs ou utiles (abeilles, coccinelles) et en particulier durant la floraison.
  Ne pas traiter sur un terrain risquant un entraînement vers un point d’eau: ruisseau, étang, mare, puits…en particulier si le terrain est en pente.
  Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
  Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement.
  Ne pas utiliser sur *Impatiens sp.* et fougères (*Nephrolepis biserrata)* car il y a un risque de phytotoxicité.

- **Après l’application :**
  Délai de rentrée dans la zone traitée : après séchage complet du produit sur les plantes.
  Eliminer les produits non utilisables dans une déchèterie et les emballages vides et rincés dans la poubelle ménagère.

Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



Bayer S.A.S. - Jardin, Espaces verts et Hygiène publique
16 rue Jean-Marie Leclair - CS90106 - F-69266 Lyon Cedex 09
Tél. : 04 72 85 43 21 - Fax : 04 72 85 48 33

